

## COVID-19: Prävention und Umgang in Primärversorgungspraxen

### Ärztlicher Fragebogen (strukturierte Symptomerfassung)

PatientIn: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr. für Rückruf: \_\_\_\_\_ Symptombeginn am: \_\_\_\_\_

COVID-19-Testung veranlasst (j/n): \_\_\_\_\_ Datum/Uhrzeit: \_\_\_\_\_


#### Symptomatik

	ja	nein	Schweregrad L (leicht), M (mittel), S (schwer)	Seit wann?
Plötzlicher Beginn				
<b>Luftnot/Kurzatmigkeit</b> ... in Ruhe				
... bei Belastung				
Fieber			°C	
<b>Beklemmungsgefühl</b>				
<b>Husten</b>				
<b>Geruchs-/Geschmacksstörung</b> (Anosmie)				
Gliederschmerzen				
Abgeschlagenheit				
Halsschmerzen/-kratzen				
Schnupfen/Niesen				
Kopfschmerzen				
Durchfall/Bauchschmerz/Übelkeit				
Anderes (z. B. Erbrechen, ausgeprägte Schluckbeschwerden, Ausschlag etc.):				

Kontakt mit einem Corona-Patienten (bestätigt/Verdacht)?/Reise in Risikogebiet?			Wer?/Wo?
Haben Sie chronische Erkrankungen?			Welche?
Nehmen Sie regelmäßig Medikamente?			Welche?

Angehöriger: \_\_\_\_\_ Maßnahme: \_\_\_\_\_

## TRIAGEPFAD am Telefon



[www.kl.ac.at/coronavirus/telefontriage-und-einstufung](http://www.kl.ac.at/coronavirus/telefontriage-und-einstufung)

## VERDACHTSFALL ungeplant in der Ordination

### Schutzkleidung

- **Maske**  
medizinisches Personal:  
FFP2/3, zumindest aber chirurgische Maske  
Patient: chirurgische Maske
- **Handschuhe**
- **Körperschutz**  
Einmalschürze oder Mantel

### Milde Symptomatik:

In der Anmeldung identifizieren und in Heimquarantäne schicken (Testung, Koordination 1450)


### Kranke mit akutem Behandlungsbedarf

#### Isolation und Untersuchung mit entsprechender Schutzkleidung:

- möglichst entfernt vom Wartebereich
- Raum möglichst nicht betreten (Kommunikation via Telefon)
- Raum ohne Teppichboden und Polstermöbel
- nahe einem getrennten WC
- Glas Wasser zur Verfügung
- Tür zu
- Klimaanlage aus
- Fenster auf
- Müllentsorgung als medizinischer Abfall
- Desinfektion aller Oberflächen und des wiederverwendbaren Equipments (mit Schutzkleidung!), wenn Patient weg ist

[www.kl.ac.at/coronavirus/verdachtsfall-in-der-ordination](http://www.kl.ac.at/coronavirus/verdachtsfall-in-der-ordination)

## PATIENT AM TELEFON



## SELBSTISOLATION Heimquarantäne


**Kontakt 1450 -  
Meldung der  
Selbstisolation**

**Bei Verschlechterung  
der Symptome/fehlender  
Besserung > 7 Tage:**  
Kontakt mit dem Hausarzt  
oder 1450

**Bei akuter, kritischer  
Verschlechterung/Notfall:** 144  
COVID-Verdacht melden!


**Doppelter Müllsack,**  
72 h Trennung vom restlichen  
Hausmüll vor Entsorgung

**Getrennte Badezimmer,**  
sonst regelmäßige Reinigung;  
**getrennte Handtücher** oder  
**Einmalhandtücher** möglich



## COVID-19 POSITIV

Wenn aus ärztlicher Sicht die Spitalseinweisung indiziert ist: Entscheidungskriterien über Betreuungsort für zu Hause lebende Patienten im Spannungsfeld Patientenautonomie/Epidemie Gesetz/Quarantäne



[www.kl.ac.at/coronavirus/palliativbetreuung](http://www.kl.ac.at/coronavirus/palliativbetreuung)